病毒性肝炎 – Chinese Health Awareness Initiative New Zealand

https://www.acma.org.nz/s/Hepatitis.pdf

Tina Sun

From Dr Derek Luo & Dr Judy Huang, Gastroenterology, CMDHB

肝炎的分類

- 病毒性肝炎
 - A型肝炎
 - B型肝炎
 - C型肝炎
 - D型肝炎
 - E型肝炎
 - 非A或B型肝炎
- 非病毒性肝炎
 - 脂肪肝
 - 酒精性
 - 藥物性
 - 自我免疫性


B型肝炎 (Hepatitis B)

又稱血清性肝炎,簡稱B肝、乙型肝炎。是一種由B型肝炎病毒(HBV)引起的、以肝臟損害為主的傳染病。可造成急性或慢性疾病。


90%成人都能够抵抗急性B型肝炎病毒,徹底康復。

慢性疾病是指B型肝炎帶原者,慢性活動性B型肝炎、乙肝肝硬化等。

B型肝炎病毒的構造



B型肝炎病程



有多少人受到影響?

全球有二十億人受到B型肝炎病毒感染。許多人清除了病毒並康復,但是有四億人無法清除病毒,成為B型肝炎帶原者。

在紐西蘭約有十萬人患有B慢性肝炎。其中又以島民 (7-14%), 東南亞華裔和華人 (9%) 和毛利人 (6%) 居多。

B型肝炎在亞洲、東南亞、印度和部分非洲和南美洲、東歐及中東地區最爲常見。 美國有一百多萬慢性B型肝炎病毒帶原者。

傳染方式

B型肝炎主要是經由血液或是體液感染。例如輸血、傷口接觸、醫療器械、刺針、親密行為及性行為等。也可由受到感染的母親在分娩時傳染給新生嬰兒。

帶原者本身不能捐血,個人之血液傷口應小心處理別接觸他人傷口黏膜,其親人也應驗血並接受疫苗注射。

B型肝炎症狀

- 急性發作
 - 疲勞或類似感冒症狀
 - 反胃或腹痛
 - 腹瀉
 - 皮膚紅疹
 - 眼白/皮膚泛黄(黄疸)
 - 淡黄色糞便
 - 黄褐色尿液
- 慢性感染
 - 和急性發作相同的臨床症狀與表徵
 - 肌肉和關節疼痛
 - ■虚弱
 - 肝硬化的臨床症狀與表徵
 - 肝癌的臨床症症狀與表徵

B型肝炎的治療

不是人人都需要治療

治療並不代表治癒B型肝炎,而是抑制B型肝炎病毒的活性,使得病毒的活性變低,肝發炎的狀況獲得改善。 http://www.printfriendly.com/print?url s=uGGC%25dN%25cS%25cSpunvAMmBEtmAM%25cScabd%25cSab%25cSab%25cSlvEny-urCnGvGvF%25cS

	干擾素(Peg IFN)	干安能 (Lamivudine)	Tenofovir	貝樂克 (Entecavir)
e抗原陰轉率	30-35%	~20%	21%	21%
HBsAg消失	3%	0	8%	2%
持久性	86%	~50%		82%
抗藥性	0	70%/5年	0%	1.0%/5年
使用途徑	皮下注射 1次/週	口服 1 顆/日	口服 1 顆/日	口服 1 顆/日
副作用	多	少	少	少
治療期間	48週	>12月	>12月	>12月

治療目標: 使得病毒的活性變低, 肝發炎的狀況獲得改善, 以防止併發症。

B型肝炎併發症

1. 肝硬化 (Cirrhosis)

肝臟發炎時,被破壞的肝細胞形成小的結節分布在肝臟上,肝變得凹凸不平而硬化。


肝硬化的治療:

• 並沒有專門治療肝硬化的藥物

- 但患者應該定期血液,肝功能癌症指數監察及腹部超音波來監察肝癌發生的可能性
- 胃鏡

2. 肝癌 (Liver Cancer / Hepatocellular Carcinoma / HCC)

肝細胞突變並成為不停分裂狀態,逐漸破壞正常的肝組織,甚至轉移至身體其他器官,最後可能危及性命。



在奧克蘭肝癌每年逐漸增加,大部份肝癌都是由B型跟C型肝炎所引起。

肝癌治療依照腫瘤,數目,大小,分期和肝功能指數治療方式都會有不同

- 手術切除 (Liver resection)
- 微波消融凝固療法 (Microwave ablation)
- 經皮高週波熱凝固療法 (Radiofrequency ablation)
- 經動脈化療栓塞 (TACE)
- 肝臟移植 (Liver transplant)

預防

- 1. 防止母子傳染:新生兒一律須接種B型肝炎疫苗。若母親是e抗原陽性,則小寶寶除了要注射B型肝炎預防針外,還必須於出生二十四小時內注射B型肝炎免疫球蛋白。
- 2. 防止水平感染:避免輸血、打針、針灸、穿耳洞、刺青、紋眉、共用牙刷、共用刮鬍刀等。
- 3. 接受B型肝炎疫苗接種,產生免疫力。疫苗是一勞永逸的方法。

什麼人須接種型肝炎疫苗呢?血液中無B型肝炎表面抗體 (HBsAb)

B型肝炎疫苗系列包括在六個月期間,分別進行三次注射。成人在胳膊上接受注射,而嬰兒在腿部接受注射。在注射首劑疫苗後,您在數周之內獲得免疫系統的保護。因此,接受疫苗永遠不嫌晚。

孕婦與B肝

所有孕婦需接受化驗,若有患有B型肝炎,你可能需要更進一步的檢查和密切監測來降低將B型肝炎病毒傳染給寶寶的機會。

孕婦: 依照肝功能和B型肝炎病毒指數, 孕婦需要口服抗病毒藥


新生兒:除了要注射B型肝炎預防針外,還必須於出生12小時內注射B型肝炎免疫球蛋白(HBIG)

罹患B型肝炎需注意那些事項?

- 應定期追蹤肝功能,必要時會做腹部超音波、胎兒蛋白、B肝病毒量等檢查。
- 日常生活作息要正常
- 勿熬夜酗酒服用坊間廣告的保肝藥,以免增加肝臟負擔
- 不要捐血
- 勿與他人共用牙刷刮鬍刀及針筒
- 避免讓人接觸到自己的血液

• 住院時,主動告知醫生護理人員

紐西蘭肝炎協會 www.hepfoundation.org.nz





免費檢查

如果你符合以下任何一條,你需要驗血以保沒有感染B肝。請詢問你的家庭醫生相關的信息或者直接聯繫紐西蘭肝炎協會,他們將提供免費 驗血。

- 華裔
- 在中國出生
- 25歲以上在紐西蘭出生的華裔
- 母親或者其他家庭成員有B肝病史

• 有和B肝患者一起居住過

最後要點

- B型肝炎必非遺傳,而是由病毒引起。
- 已有一種安全的疫苗。
- 已有一種簡單的驗血方法。
- 已有治療選擇

更多中文資訊:

Additional information (Looking after yourself with Hepatitis B / Pregnancy & Hepatitis) in PDF – from the Hepatitis Foundation of New Zealand.

ACMA.ORG.NZ © 2021 | All Rights Reserved.